

# FONCTIONS CIRCULAIRES

Sont appelées fonctions circulaires les fonctions liées au cercle trigonométrique, à savoir notamment les fonctions sinus, cosinus et tangente.

Rappelons une façon de définir ces trois fonctions :


Si  $H$  est l'intersection de la tangente au cercle en  $I$  avec la droite orientée  $(OM)$

$$\text{alors } \tan x = \overline{IH} .$$

Cette définition prolonge celle déjà connue dans le triangle rectangle. En effet, lorsque  $x$  est une mesure d'un angle aigu, on a dans

le triangle  $OIH$  rectangle en  $I$  :

$$\tan x = \frac{IH}{OI} = \frac{IH}{1} = IH$$



## RAPPELS

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

(la fonction cosinus est paire)

$$\sin(-x) = -\sin x$$

(la fonction sinus est impaire)

Exercice : par un raisonnement géométrique, démontrer que :  $\sin x \leq x \leq \tan x$  pour tout  $x \in [0 ; \frac{\pi}{2} [$ .

## I) Fonction périodique

Définition : Soit  $f$  une fonction définie sur un domaine  $D_f$  et  $T$  un nombre réel **non nul**. On dit que  $f$  est périodique de période  $T$  (ou  $T$ -périodique) si :

$$\text{pour tout réel } x \in D_f, x + T \in D_f \text{ et } \underline{f(x + T) = f(x)}$$

Exemples : les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions  $2\pi$ -périodiques définies sur  $\mathbb{R}$ . Cela se traduit par les relations :  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$  et  $\sin(x + 2\pi) = \sin x$  pour tout réel  $x$ .

Intérêt : dès qu'une fonction  $T$ -périodique est connue sur un intervalle de longueur  $T$ , alors elle est connue sur tout son ensemble de définition. Il suffit de compléter la courbe par translation de vecteur  $k T \vec{i}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ). Pour étudier (ou tracer) une fonction périodique, on se limite donc à une période.

Notons que si  $T$  est une période, tout multiple de  $T$  en est une autre :

$$\dots = f(x + 2T) = f(x + T) = f(x) = f(x - T) = f(x - 2T) = \dots$$

Application : calculer  $\cos(73\pi)$ . Puisque  $2\pi$  est une période de la fonction cosinus,  $36 \times 2\pi = 72\pi$  en est une également, on a donc  $\cos(73\pi) = \cos(\pi + 72\pi) = \cos(\pi) = -1$ .

Méthode pour trouver la période d'une fonction trigonométrique :

Commençons par un exemple :  $f(x) = \cos 3x ; T = ?$

La relation  $f(x + T) = f(x)$  se traduit par :

$$\cos(3(x + T)) = \cos(3x + 3T) = \cos 3x, \text{ donc } 3T = 2\pi, T = \frac{2\pi}{3}.$$

Généralisons :

la période de la fonction définie par  $f(t) = \cos(\omega t + \varphi)$  est  $T = \frac{2\pi}{\omega}$   
la période de la fonction définie par  $f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$  est  $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Démonstration :  $f(t + \frac{2\pi}{\omega}) = \cos(\omega(t + \frac{2\pi}{\omega}) + \varphi) = \cos(\omega t + \varphi + 2\pi) = \cos(\omega t + \varphi) = f(t)$ .

Démonstration analogue pour la fonction sinus.

## II) Étude des fonctions sinus, cosinus et tangente

---

Nous le savons déjà, les fonctions sinus et cosinus sont  $2\pi$ -périodiques, définies sur  $\mathbb{R}$ . Nous pouvons donc nous contenter de les étudier sur un intervalle de longueur  $2\pi$ , par exemple  $[0 ; 2\pi[$  ou  $]-\pi ; \pi]$ . Mais nous savons, de plus, que la fonction cosinus est paire ( $\cos(-x) = \cos x$ ) et que la fonction sinus est impaire ( $\sin(-x) = -\sin x$ ). Leurs représentations graphiques admettent donc des symétries. C'est pourquoi nous étudierons ces fonctions sur  $[0 ; \pi[$ .

Nous rappelons les résultats fondamentaux suivants :

**La fonction sinus est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa fonction dérivée est la fonction cosinus**  
**La fonction cosinus est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et sa fonction dérivée est la fonction - sinus**

De manière plus générale,  
**la dérivée de  $\sin(ax + b)$  est  $a \cos(ax + b)$**   
**la dérivée de  $\cos(ax + b)$  est  $-a \sin(ax + b)$ .**

Exemple de démonstration : pour la fonction sinus ;  $f(x) = \sin x$

L'accroissement moyen de  $f$  en  $x$  s'écrit :

$$\frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h - \sin h \cos x - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} - \frac{\sin h}{h} \cos x$$

Or, on démontre que  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$  et  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$ . D'où  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \cos x$ .

Ces résultats nous permettent de trouver les variations des fonctions sinus et cosinus :

### FONCTION SINUS

Posons  $f(x) = \sin x$ . On a donc  $f'(x) = \cos x$


Sur  $[0 ; \frac{\pi}{2} [$ ,  $f'(x) = \cos x > 0$ , donc la fonction sinus est strictement croissante sur  $[0 ; \frac{\pi}{2} [$ .

Sur  $] \frac{\pi}{2} ; \pi]$ ,  $f'(x) = \cos x < 0$  donc la fonction sinus est strictement décroissante sur  $] \frac{\pi}{2} ; \pi]$ .

D'où le tableau de variations de la fonction sinus :

$x$	0		$\frac{\pi}{2}$		$\pi$	
$f'(x) = \cos x$	1	+	0	-	-1	
Variations de sin	0	↗		1	↘	
						0

On en déduit la représentation graphique de la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \sin x$  sur  $[0 ; \pi[$  que l'on complétera sur  $[-\pi ; \pi]$  par symétrie par rapport à l'origine puis, sur  $\mathbb{R}$ , par translation de vecteur  $2k\pi \vec{i}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).



### FUNCTION COSINUS


Posons  $f(x) = \cos x$ . On a donc  $f'(x) = -\sin x$

Sur  $[0 ; \pi[$ ,  $f'(x) = -\sin x < 0$ , donc la fonction cosinus est strictement décroissante sur  $[0 ; \pi[$ .

D'où le tableau de variations de la fonction cosinus :

$x$	0		$\frac{\pi}{2}$		$\pi$	
$f'(x) = -\sin x$	0	-	-1	-	0	
variations de cos	1	↘		0	↘	
						-1

On en déduit la représentation graphique de la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \cos x$  sur  $[0 ; \pi[$  que l'on complétera sur  $[-\pi ; \pi]$  par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis sur  $\mathbb{R}$ , par translation de vecteur  $2k\pi \vec{i}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).



## FONCTION TANGENTE

Posons : 
$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Ensemble de définition :  $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$  car  $\cos x$  s'annule pour  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Parité : La fonction tangente est impaire. En effet,  $D_f$  est symétrique par rapport à 0, et de plus :

$$\text{pour tout } x \in D_f, \text{ on a : } \tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$$

Périodicité : la fonction tangente est  $\pi$ -périodique. En effet :

$$\text{pour tout } x \in D_f, \text{ on a } \tan(x + \pi) = \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$$

La fonction tangente étant  $\pi$ -périodique et impaire, nous pouvons restreindre son étude à l'intervalle  $\left[0 ; \frac{\pi}{2} \right[$ .

Limites au bornes de l'intervalle d'étude :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} = 0 \text{ car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin x}{\cos x} = +\infty \text{ car } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sin x = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \cos x = 0 \text{ avec } \cos x > 0. \end{aligned}$$

La fonction tangente admet donc une asymptote verticale d'équation  $x = \frac{\pi}{2}$ .

Dérivée : la fonction  $f$  est de la forme  $\frac{u}{v}$ , sa dérivée  $f'$  sera donc égale à  $\frac{u'v - uv'}{v^2}$ , ce qui donne :


$$f'(x) = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

Sens de variation : puisque  $\frac{1}{\cos^2 x}$  est strictement positif pour tout réel  $x$  de  $\left[0 ; \frac{\pi}{2} \right[$ , on en déduit que la fonction tangente est strictement croissante sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2} \right[$ .

Tableau de variations :

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$
signe de $f'(x)$	+	
variations de tan		

D'où la représentation graphique de la fonction tangente sur  $\left[0 ; \frac{\pi}{2} \right[$  que l'on complétera sur  $\left]-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$  par symétrie par rapport à l'origine puis sur  $D_f$ , par translation de vecteur  $k\pi \vec{i}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).



Exercice : étudier la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(t) = t + \sin t$ .

Parité :  $f$  est impaire. On peut restreindre l'intervalle d'étude à  $[0 ; +\pi[$ .

Périodicité : aucune. Cependant :  $f(t + 2\pi) = 2\pi + f(t)$ , pour tout  $t \in \mathbb{R}$ .

On peut donc étudier la fonction sur  $[0 ; \pi[$ . On complétera la courbe, d'une part, par symétrie par rapport à l'origine  $O$  du repère ( $f$  impaire) puis à l'aide de translations de vecteurs  $2k\pi(\vec{i} + \vec{j})$ .

Comme,  $t - 1 \leq f(t) \leq t + 1$ , on en déduit  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$  et  $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = -\infty$ .

Dérivée :  $f'(t) = 1 + \cos t \geq 0$  et  $f'(t) = 0 \Leftrightarrow \cos t = -1 \Leftrightarrow t = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

Tableau de variations :

$t$	0		$\pi$
Signe de la dérivée $f'$	0	+	0
Variations de la fonction $f$	0	→ $\pi$	

Courbe :

